



INFOBLATT

Brustfehlbildung

Allgemeine Informationen zu Brustfehlbildung, zusammengestellt von CZ-Wellmed.

Häufige Formen

Bei der tuberösen Brust ist die Brustbasis schmal, die Brust wirkt röhrenförmig und der Warzenhof ist oft vergrößert. Bei einer starken Asymmetrie unterscheiden sich die Brüste deutlich in Größe, Form oder Position. Beim Poland-Syndrom fehlen einseitig Teile des Brustmuskels und oft auch Brustgewebe.

Möglichkeiten der Korrektur

Je nach Befund kommen Implantate, eine Straffung, Eigenfett oder eine Kombination in Frage. Oft sind mehrere Schritte nötig, um ein ausgewogenes Ergebnis zu erreichen. Die Planung erfolgt individuell nach ärztlicher Untersuchung. Zur ersten Einschätzung senden wir Ihnen auf Wunsch einen sicheren Weg zur Übermittlung von Fotos.

Hinweis zu Risiken

Es gelten die allgemeinen und die implantatbezogenen Risiken wie bei Brustvergrößerung und Bruststraffung. Ein vollkommen symmetrisches Ergebnis ist nicht immer erreichbar.

Ihr nächster Schritt

Senden Sie uns Ihre Fotos verschlüsselt über www.brust-op.com oder wählen Sie einen Rückruf-Termin. Oder rufen Sie uns an: **07161 304 8150**, Mo bis Do 8 bis 19 Uhr, Fr 8 bis 16:30 Uhr.

Allgemeine Informationen. Sie ersetzen weder die ärztliche Aufklärung noch ein persönliches Beratungsgespräch. Im Zweifel gelten die Anweisungen Ihrer Ärztin oder Ihres Arztes und der Klinik.