



INFOBLATT

Brustwarzenkorrektur

Allgemeine Informationen zu Brustwarzenkorrektur, zusammengestellt von CZ-Wellmed.

Welche Korrekturen gibt es?

- **Schlupfwarzen:** Die Brustwarze liegt nach innen gezogen. Operativ wird sie durch Lösen der verkürzten Milchgänge nach außen gebracht. Dabei ist eine spätere Stillfähigkeit unter Umständen eingeschränkt.
- **Große Warzenhöfe:** Die Warzenhofhaut wird verkleinert, die Narbe verläuft am Rand des Warzenhofs.
- **Versetzen der Brustwarze:** Bei hängender Brust wird die Warzenposition meist im Rahmen einer Straffung oder Verkleinerung angepasst.
- **Ungleiche Größe oder Form:** Einzelne Korrekturen sind auch separat möglich.

Ablauf und Nachsorge

Der Eingriff wird je nach Umfang in örtlicher Betäubung oder Vollnarkose durchgeführt. Nach der Operation tragen Sie einen Verband. Für die ersten Wochen sind Druck und Belastung der Brust zu vermeiden. Die Narben sind unauffällig und verblassen im Verlauf.

Mögliche Risiken

Es gelten die allgemeinen Operationsrisiken wie Nachblutung, Infektion und Wundheilungsstörung. Möglich sind außerdem Veränderungen der Empfindung der Brustwarze, Asymmetrien, eine Einschränkung der Stillfähigkeit und bei Schlupfwarzen ein erneutes Einziehen.

Ihr nächster Schritt

Senden Sie uns Ihre Fotos verschlüsselt über www.brust-op.com oder wählen Sie einen Rückruf-Termin. Oder rufen Sie uns an: **07161 304 8150**, Mo bis Do 8 bis 19 Uhr, Fr 8 bis 16:30 Uhr.

Allgemeine Informationen. Sie ersetzen weder die ärztliche Aufklärung noch ein persönliches Beratungsgespräch. Im Zweifel gelten die Anweisungen Ihrer Ärztin oder Ihres Arztes und der Klinik.